

Риск развития рака

Препарат РАНВЭК потенциально может увеличить риск развития рака, особенно рака кожи.

Сообщите своему врачу, если Вы заметите какие-либо изменения внешнего вида участка кожных покровов или заметите рост новообразования на Вашей коже.

Риск перфорации желудочно-кишечного тракта

Препарат РАНВЭК может увеличить риск перфорации желудочно-кишечного тракта, особенно если у Вас болезнь Крона. Незамедлительно свяжитесь со своим врачом, если у Вас возникла неожиданная или необъяснимая боль в животе.

Показывайте эту памятку любому специалисту здравоохранения, оказывающему Вам медицинскую помощь, например, стоматологу или врачу скорой и неотложной медицинской помощи.

▼ Этот лекарственный препарат подлежит дополнительному мониторингу. Свяжитесь со своим врачом, чтобы сообщить о любых нежелательных явлениях.

Материал подготовлен компанией AbbVie.
Контактные данные Представительства компании «ЭббВи Биофармасьютикалс ГмбХ» в Республике Казахстан: БЦ «Алатау Гранд», ул. Тимирязева, 28в, г. Алматы, 050040, тел.: +7 (727) 222-1481, e-mail: kz_ppd_pv@abbvie.com
JAKa-KZ-00027-E
Дата одобрения: май 2025

ФИО пациента:

ФИО врача, назначившего препарат РАНВЭК:

Номер телефона врача:

Дата начала приема препарата РАНВЭК:

¹Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата РАНВЭК: http://register.ndda.kz/category/search_prep. Дата доступа: 17.03.2025.

Памятка пациента

Постоянно храните эту памятку при себе (или у лица, осуществляющего уход)

Информация о безопасности препарата РАНВЭК ▼ (упадацитиниб) для пациентов

- Эта памятка содержит важную информацию о безопасности, которую Вам следует знать до и во время лечения препаратом РАНВЭК.
- Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата РАНВЭК¹

Риск возникновения инфекций

Препарат РАНВЭК может ухудшить течение уже имеющейся инфекции или увеличить вероятность возникновения новой инфекции, например, туберкулеза, опоясывающего герпеса или вирусного гепатита.

Немедленно сообщите своему врачу, если Вы заметили признаки инфекции, такие как:

- лихорадка, потливость, озноб, потеря веса или кашель, который не исчезает - это могут быть признаки туберкулеза;
- болезненная кожная сыпь с волдырями — это может быть признак опоясывающего герпеса;
- чувство усталости или одышка — это могут быть симптомы пневмонии.

Сообщите своему врачу, если:

- Вам недавно диагностировали туберкулез или Вы когда-либо болели туберкулезом;
- Вы недавно находились в тесном контакте с человеком, больным туберкулезом.

Вакцины, используемые для профилактики инфекций

Живые вакцины (например, вакцины против гриппа в форме назального спрея, ветряной оспы, кори/эпидемического паротита/краснухи) не следует применять во время лечения препаратом РАНВЭК или непосредственно перед началом приема препарата РАНВЭК.

Прежде чем вакцинироваться, проконсультируйтесь со своим врачом — ему должно быть известно, какие вакцины Вам не следует применять до или во время лечения препаратом РАНВЭК.

Риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы

Лечение препаратом РАНВЭК было связано с повышением содержания холестерина (жира в крови). Ваш врач будет проверять уровень содержания холестерина, пока Вы принимаете препарат РАНВЭК.

Немедленно сообщите своему врачу, если Вы заметили такие признаки, как боль или стеснение в груди, так как это может быть симптомом заболевания сердечно-сосудистой системы.

Контрацепция, беременность и кормление грудью

Препарат РАНВЭК нельзя принимать во время беременности.

- Используйте эффективные методы контрацепции во время лечения препаратом РАНВЭК и в течение 4 недель после приема последней дозы. Проконсультируйтесь со своим врачом касательно эффективных методов контрацепции.
- Если Вы планируете беременность или забеременели, незамедлительно сообщите об этом своему врачу.
- Не кормите грудью в период лечения препаратом РАНВЭК.

Риск образования тромбов в венах или легких

При приеме препарата РАНВЭК наблюдались случаи образования тромбов в венах или легких. Немедленно сообщите своему врачу, если Вы заметили признаки образования тромбов в венах или легких, такие как болезненная отечность ноги, одышка или боль в груди.