

ПАМЯТКА

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, ПРИНИМАЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

ЛУСЕФИ (ЛУСЕОГЛИФЛОЗИН)

таблетки, покрыты пленочной
оболочкой, 2,5 мг и 5 мг

Указанные в памятке меры
предосторожности направлены на
снижение риска развития определенных
нежелательных реакций.

В памятке также объясняется, как
распознать проявления нежелательных
реакций и что делать в этих ситуациях.

Перед применением лекарственного препарата
Лусефи внимательно прочтите листок-вкладыш,
который вложен в упаковку с препаратом.

Если у вас возникнут вопросы по заболеванию или по
назначеному лечению, обсудите их с вашим врачом.

Памятка для пациентов, принимающих лекарственный препарат Лусефи

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ И МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обезвоживание (недостаточное количество жидкости в организме)

Препарат Лусефи может увеличивать выведение
жидкости из организма с мочой и вызывать следующие
симптомы:

- сухость во рту или горле,
- увеличение объема выделяемой мочи (полиурия),
- увеличение количества мочеиспусканий (поллакурия).

В следующих случаях возрастает риск обезвоживания
и вам следует проявлять особую осторожность:

- вы обильно потеете (например, в летнее время или во
время занятий спортом),
- у вас отмечается лихорадка, диарея или рвота,
- вы не можете принимать пищу в достаточном
количестве,
- вы пьете мало воды (например, в зимнее время),
- у вас плохо контролируется уровень глюкозы крови,
- вы принимаете мочегонные средства (диуретики)
одновременно с препаратом Лусефи.

Основные симптомы обезвоживания:

- жажда, сухость во рту или горле,
- ощущение дурноты,
- ощущение головокружения и других подобных
симптомов.

❗ В случае развития обезвоживания прекратите
прием препарата и немедленно обратитесь за
медицинской помощью.

✓ Пейте достаточное количество жидкости для
предотвращения обезвоживания. Вместо большого
объема за один раз лучше пить часто и небольшими
порциями, даже при отсутствии сухости во рту
или горле.

Во время лечения препаратом Лусефи не
ограничивайте себя в употреблении жидкости из-за
опасения увеличения объема мочи или количества
мочеиспусканий.

✓ Для пациентов пожилого возраста: будьте
внимательны, поскольку сложно заметить
симптомы обезвоживания, такие как сухость во рту
или горле.

✓ Если вы заболели и у вас отмечается сильная диарея,
лихорадка или вы не можете принимать пищу
в достаточном количестве, у вас может развиться
обезвоживание. Немедленно проконсультируйтесь
с врачом.

Памятка для пациентов, принимающих лекарственный препарат Лусефи

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ И МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Диабетический кетоацидоз (увеличение количество кетоновых тел в крови)

Поскольку препарат Лусефи усиливает метаболизм
(обмен) жирных кислот, в крови увеличивается
количество кетоновых тел - продуктов распада жирных
кислот, что может привести к кетоацидозу.

Что такое кетоацидоз?

Кетоацидоз означает увеличение количества
кетоновых тел в крови, при котором также повышается
кислотность крови и происходят изменения
в физическом состоянии. Если кетоацидоз не будет
выявлен и будет прогрессировать, он может привести
к нарушению сознания.

Вы должны следить за следующими изменениями своего
физического состояния при лечении препаратом Лусефи:

Основные симптомы кетоацидоза:

- быстрая потеря веса,
- тошнота, рвота,
- снижение/потеря аппетита,
- общее недомогание,
- боль в животе,
- чувство сильной жажды,
- учащенное и глубокое дыхание,
- нарушение сознания, дезориентация,
- необычная сонливость или усталость,
- сладкий запах (запах ацетона) при дыхании,
- сладкий или металлический привкус во рту,
- необычный запах мочи, пота.

❗ В случае появления этих симптомов прекратите
прием препарата и немедленно обратитесь за
медицинской помощью.

Кетоацидоз может возникнуть в следующих ситуациях, поэтому проявляйте особую осторожность:

- если доза инсулина была снижена или лечение
инсулином было прекращено,
- если вы слишком строго ограничили потребление
углеводов,
- если вы недостаточно пьете,
- если у вас развилась какая-либо инфекция,
- если у вас отмечается симптомы обезвоживания.

Для профилактики

Не ограничивайте чрезмерно потребление углеводов;
питье и пейте жидкость в достаточном количестве.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ И МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Инфекции мочевыводящих путей и инфекции половых органов

Поскольку глюкоза выводится с мочой, то могут развиваться инфекции мочевыводящих путей и половых органов при лечении препаратом Лусефи. Обращайте внимание на симптомы инфекции в течение всего периода приема препарата Лусефи.

Основные симптомы инфекции половых органов:

- зуд в области половых органов,
- ощущение жжения в области половых органов,
- боль или болезненная чувствительность, покраснение или отек половых органов или промежности (области между половыми органами и задним проходом) в сочетании с лихорадкой или чувством недомогания- эти симптомы могут быть признаком редкой, но серьезной или даже опасной для жизни инфекции, называемой «некротизирующий фасциит промежности или гангрена Фурнье», которая разрушает ткани под кожей.

! В случае возникновения подобных симптомов немедленно обратитесь за медицинской помощью. При подозрении на гангрену Фурнье прекратите прием препарата.

Основные симптомы инфекции мочевыводящих путей:

- боль при мочеиспускании,
- зуд в области половых органов,
- ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря при мочеиспускании,
- болезненность, покраснение, отек в области половых органов.

! В случае возникновения подобных симптомов немедленно проконсультируйтесь с врачом. При усугублении инфекции мочевыводящих путей может развиться пиелонефрит или сепсис.

Для профилактики:

- следите за регулярностью мочеиспускания и старайтесь не терпеть при позывах на мочеиспускание,
- следите за чистотой и соблюдайте ежедневную гигиену половых органов.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ И МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Снижение уровня сахара в крови (гипогликемия)

Основные симптомы гипогликемии:

- холодный пот,
- дрожь в руках и ногах,
- ощущение сильного голода,
- слабость.

Гипогликемия может возникнуть в следующих случаях:

- при задержке в приеме пищи или при приеме недостаточного количества пищи,
- при употреблении большого количества алкоголя,
- при чрезмерных физических нагрузках.

При прогрессировании гипогликемии пациент может потерять сознание.

В случае появления симптомов немедленно съешьте сахар (пишу, богатую углеводами) или выпейте напиток с сахаром.

Примечание: если вы принимаете ингибиторы α -глюкозидазы (акарбоза, voglibоза, миглитол и др.) вместе с препаратом Лусефи, то следует принять глюкозу.

- !** Если после этого симптомы не проходят, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- ✓** Определенные комбинации препаратов могут увеличивать вероятность гипогликемии. Перед началом применения других препаратов следует проконсультироваться с врачом.
- ✓** Если гипогликемия возникнет, когда вы управляете автомобилем, работаете на высоте или с механизмами, это может привести к аварии/ несчастному случаю. Будьте особенно осторожны.

▼ Лекарственный препарат подлежит дополнительному мониторингу, который способствует быстрому выявлению новых сведений о безопасности. Вы можете помочь, сообщая информацию о любых нежелательных реакциях, которые возникли в период применения лекарственного препарата (в том числе и о случаях его неэффективности).

Сообщения о нежелательных реакциях:

Если при применении препарата Лусефи у вас возникла нежелательная реакция, пожалуйста, сообщите об этом вашему врачу. Вы также можете передать информацию по указанным ниже контактам:

РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан
<http://www.ndda.kz>

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в ТОО «Сервье Казахстан»:

050020, г. Алматы, пр-т Достык 310г, Бизнес центр, 3 этаж
Тел.: (727) 386 76 62/63/64/70/71, Факс: (727) 386 76 67

Электронная почта: kazadinfo@servier.com

Форма обратной связи на интернет-сайте
www.servier.kz