

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА

ПРЕПАРАТ СОЛИКВА® СОЛОСТАР® (ИНСУЛИН ГЛАРГИН 100 ЕД/мл + ЛИКСИСЕНАТИД) В ФОРМЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАПОЛНЕННЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК С ДВУМЯ РАЗЛИЧНЫМИ ДОЗИРОВКАМИ.

Уважаемый специалист здравоохранения,

Цель настоящего письма - донести до Вас важную информацию о дозировании препарата Соликва® Солостар®, который, в комбинации с метформином, предназначен для улучшения гликемического контроля у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа с недостаточной эффективностью монотерапии метформином или терапии комбинацией метформина с другим пероральным гипогликемическим средством или базальным инсулином.

Резюме

Соликва® Солостар® это комбинация двух зарегистрированных в Казахстане препаратов в фиксированном отношении: инсулин гларгин 100 ЕД/мл (Лантус®) и ликсисенатид (Ликсумия). Препарат Соликва® Солостар® выпускается в форме двух предварительно заполненных шприц-ручек, содержащих различные дозировки ликсисенатида и разные диапазоны доз инсулина гларгин 100 ЕД/мл. Препарат предназначен для лечения пациентов с различной потребностью в инсулине в дозах до 60 единиц.

- Оба типа шприц-ручек содержат инсулин гларгин в концентрации 100 ЕД/мл.
- Шприц-ручка Соликва® Солостар® (10-40) позволяет выполнять инъекции один раз в день в дозах в диапазоне от 10 до 40 единиц препарата (концентрация: инсулин гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатид 50 мкг/мл; диапазон доз: инсулин гларгин 10 - 40 единиц в комбинации с ликсисенатидом 5 - 20 мкг). Шприц-ручка желтого цвета с оранжевой кнопкой для инъекции.
- Шприц-ручка Соликва® Солостар® (30-60) позволяет выполнять инъекции один раз в день в дозах в диапазоне от 30 до 60 единиц препарата (концентрация: инсулин гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатид 33 мкг/мл; диапазон доз: инсулин гларгин 30 - 60 единиц в комбинации с ликсисенатидом 10 - 20 мкг). Шприц-ручка оливкового цвета с коричневой кнопкой для инъекции.
- Обе формы препарата Соликва® Солостар® выпускаются в шприц-ручках Солостар®.

ШПРИЦ-РУЧКА СОЛИКВА® СОЛОСТАР® 10-40

В 1 мл раствора для подкожного введения
100 ЕД/мл инсулина гларгин и 50 мкг/мл
ликсисенатида



ШПРИЦ-РУЧКА СОЛИКВА® СОЛОСТАР® 30-60

В 1 мл раствора для подкожного введения
100 ЕД/мл инсулина гларгин и 33 мкг/мл
ликсисенатида



Подробное руководство с дополнительной информацией, а также руководство для пациентов, предназначенное для передачи пациентам, получающим лечение Соликва® Солостар® прилагаются.

Информация, содержащаяся в этом сообщении, согласована с Национальным центром экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Дополнительные рекомендации по назначению препарата можно найти в общей характеристике лекарственного препарата Соликва® СолоСтар®.

Если у вас есть вопросы или вам необходима дополнительная информация, пожалуйста, обратитесь в службу медицинской информации ТОО «Санофи-авентис Казахстан» по адресу: г. Алматы, пр. Н. Назарбаев, 187Б, тел.: +7 (727) 244 50 96, телефон горячей линии 8 800 080 00 22, адрес электронной почты: Medinfo.Kazakhstan@sanofi.com

Специалисты в области здравоохранения должны сообщать о нежелательных реакциях и прочей информации по фармакобезопасности при применении данного лекарственного средства через портал на сайте Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий на сайте www.ndda.kz.

Также данная информация может быть передана в ТОО «Санофи-авентис Казахстан» по телефону 8 800 080 00 22 или по электронной почте Kazakhstan.Pharmacovigilance@sanofi.com.

ТОО «Санофи-авентис Казахстан», А15Т6К6, г.Алматы, пр.Н.Назарбаева 187Б, тел: +7(727)244-50-96.

Прилагается:

- Руководство по применению Соликва® СолоСтар® для специалистов здравоохранения
- Руководство для пациентов

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства (Листок-вкладыш) Соликва® СолоСтар®



Общая характеристика лекарственного препарата Соликва® СолоСтар®

