

Жағымсыз әсерлері туындағанда немесе жүктілік анықталған жағдайда емдеуші дәрігер ағзадан Абаджио® препаратын қаннан тез шығаруға арналған жылдамдатылған процедурасын ұсынуы мүмкін.

Бұл процедура күніне екі рет 50 г белсендірілген көмірді немесе 11 күн бойы күніне үш рет 4/8 г холестираминді қолданудан тұрады. Бұл процедураның тиімділігі емдеуші дәрігер тағайындаған қан талдауымен расталуы тиіс.

Толық ақпарат алу үшін Абаджио® препаратының медициналық қолданылуы жөніндегі нұсқаулығын оқыңыз.

Қосымша мәлімет алу немесе жағымсыз әсерлері туралы ақпарат беру үшін емдеуші дәрігермен хабарласыңыз.

Бұл картаны өзіңізге дәрігерлік көмек көрсететін кез-келген дәрігерге немесе емес емес дәенсаулық сақтау маманына көрсетіңіз (мысалы, денсаулық сақтау жүйесінің кез-келген бұзылуына жағдайда Cізге басқа дәрігерлер көмек көрсеткен кездері).

Абаджио® қайталанатын-ремиссиялы жайылған склерозбен ауыратын ересек пациенттерді емдеуге арналған. Бұл препарат бауыр қызметіне әсер етуді мүмкін. Сондай-ақ, қажасулардың сабына, иммундық жүйеге әсер етуді мүмкін. Бұл препарат бауыр қызметіне әсер етуді мүмкін. Сондай-ақ, қажасулардың сабына, иммундық жүйеге әсер етуді мүмкін. Бұл препарат бауыр қызметіне әсер етуді мүмкін. Сондай-ақ, қажасулардың сабына, иммундық жүйеге әсер етуді мүмкін.

Күніне бір
таблетка


АБАДЖИО®
(терифлуномид)^{14 мг}

genzyme
A SANOFI COMPANY

ЕМДЕЛУШІНІҢ КАРТАСЫ

Емделушінің бұл картасы Абаджио® препаратымен емдеу барысындағы қауіпсіздікке қатысты маңызды ақпаратты қамтиды.

Төмендегі симптомдардың бірі пайда болған жағдайда емдеуші дәрігеріңізге дереу жолығыңыз:

- Кенеттен жүректің айнуы
- Асқазанның ауыруы
- Терінің немесе көз склерасының сарғаюы
- Құсу
- Қошқыл түсті несеп

Егер Сіз жүктілікке қабілетті жастағы әйел болсаңыз, Абаджо® препаратын қолдану алдында жүкті емес екеніңізге көз жеткізіңіз.

Абаджо® препаратымен емдеуді тағайындау алдында Сізден емдеуші дәрігеріңіз жүктілік тестінен өтуді сұрауы мүмкін. Сонымен бірге, емдеуші дәрігеріңізбен келісілген контрацепцияның сенімді әдістерін қолданыңыз.

Абаджо® пероралдық гормонды контрацептивтердің тиімділігіне әсер етпейді. Абаджо®-мен емдеу барысында, жүктіліктен сақтану шараларын алмастырмас немесе оларды қолдануды тоқтатпас бұрын, бұл туралы емдеуші дәрігеріңізді хабардар етіңіз.

Егер жүкті болуым ықтимал деп сезіктенсеңіз, дереу емдеуші дәрігермен хабарласыңыз.

Егер жүктілікті жоспарласаңыз немесе бала емізіп жүрсеңіз, бұл жөнінде дәрігерді хабардар етуіңіз қажет.

Міндетті түрде барлық қан талдауларын тапсырып, емдеуші дәрігеріңіз тағайындағандай қан қысымын тексеріңіз. Сондай-ақ, әрбір келген сайын денсаулық сақтау маманына басқа да қабылдайтын дәрілеріңіздің және денсаулығыңыздың жай-күйінің өзгерістерінің тізімін көрсетіңіз.

Емделушінің аты-жөні:

Абаджо® препаратының алғашқы тағайындау күні: ____/____/____

Орталықтың атауы:

Емдеуші дәрігердің аты-жөні:

Емдеуші дәрігердің телефон нөмірі: