

В случае возникновения нежелательного явления или наступления беременности лечащий врач может предложить вам процедуру ускоренного выведения препарата из крови для ускорения процесса выведения Абаджиро® из организма.

Данная процедура включает применение 50 г активированного угля два раза в день или 4/8 г холестирамина три раза в день в течение 11 дней. Эффективность данной процедуры должна быть подтверждена анализами крови, назначаемыми лечащим врачом.

Для получения более подробной информации прочтите инструкцию по медицинскому применению препарата Абаджиро®.

Для получения более подробной информации или для предоставления информации о возникновении нежелательного явления обратитесь к своему лечащему врачу.

Показывайте данную карту любому врачу или специалисту, оказывающему вам медицинскую помощь (например, в случае экстренной помощи) и информируйте его о состоянии здоровья, при котором могут возникнуть нежелательные явления (иные).

Абаджиро® предназначен для лечения взрослых пациентов, страдающих рецидивирующей-ремиттирующей рассеянной склерозом. Данный лекарственный препарат может оказывать воздействие на функцию печени. Он также может оказывать воздействие на количество клеток крови и на иммунную систему и может увеличивать риск возникновения инфекции/серьезных инфекций.

Одна таблетка
ежедневно


АБАДЖИО®
(терифлуномид)^{14 мг}

genzyme
A SANOFI COMPANY

КАРТА ПАЦИЕНТА

Данная карта пациента содержит важную информацию по безопасности, которую вам необходимо знать при получении лечения препаратом Абаджиро®.

При наличии каких-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к своему лечащему врачу:

- Неожиданная тошнота
- Рвота
- Боль в желудке
- Моча темного цвета
- Пожелтение кожи или склер Ваших глаз

Если Вы являетесь женщиной репродуктивного возраста, у Вас не должно быть беременности перед началом применения Абаджио®.

Ваш лечащий врач может попросить Вас пройти профилактический тест на беременность перед назначением лечения препаратом Абаджио®. Кроме того, вам необходимо использовать эффективный метод контрацепции, согласованный с Вашим лечащим врачом.

Абаджио® не оказывает воздействие на эффективность пероральных гормональных контрацептивов. Перед заменой или прекращением применения контрацептивных мер во время лечения Абаджио® необходимо уведомить об этом своего лечащего врача.

Если у Вас есть подозрение на беременность, пожалуйста, немедленно свяжитесь со своим лечащим врачом.

Если Вы планируете беременность или кормите грудью, Вам следует также обсудить это со своим лечащим врачом.

Убедитесь, что Вы сдали все последующие анализы крови и прошли проверку артериального давления, как было назначено Вашим лечащим врачом. Также убедитесь в том, что у Вас с собой имеется список всех других применяемых лекарственных средств и список нарушений состояния здоровья при каждом посещении специалиста здравоохранения.

Имя пациента:

Дата первого назначения Абаджио®: ____/____/____

Название центра:

Имя лечащего врача:

Телефонный номер лечащего врача:
