

СОДЕРЖАНИЕ 12_18

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ.....4

ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №349 ОТ 19 НОЯБРЯ 2018 ГОДА «ОБ ОТЗЫВЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ «СУПЕРОПТИК ГИДРОБАЛАНС, УВЛАЖНЯЮЩИЕ ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ, ВО ФЛАКОНАХ», ПО 5 МЛ, №1 ИЛИ №2»

ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №350 ОТ 19 НОЯБРЯ 2018 ГОДА «ОБ ОТЗЫВЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «ФАРМАТОН® КИДДИ®, ТАБЛЕТКИ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ, №30, ВО ФЛАКОНЕ»

ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №356 ОТ 21 НОЯБРЯ 2018 ГОДА «О СНЯТИИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ «ВАНКОГЕН, ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 1 Г» ПРОИЗВОДСТВА АЛКЕМ ЛАБОРАТОРИЗ ЛИМИТЕД, ИНДИЯ, СЕРИИ 6133495, «ВИДИКСАНОЛ®, РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 270 МГ ЙОДА/МЛ, 50 МЛ» ПРОИЗВОДСТВА ТОО «НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ», КАЗАХСТАН, СЕРИИ 18150020517»

ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №357 ОТ 22 НОЯБРЯ 2018 ГОДА «ОБ ОТЗЫВЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «ТИЕНАМ, ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ ИНФУЗИЙ, 1 Г», ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ – ШЕРИНГ-ПЛАУ СЕНТРАЛ ИСТ АГ, ШВЕЙЦАРИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – МЕРК ШАРП И ДОУМ КОРП., США»

ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК №369 ОТ 29 НОЯБРЯ 2018 ГОДА «О СНЯТИИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ «КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С КАТЕТЕРОМ И КЛАПАНОМ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ СТЕРИЛЬНАЯ, ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ «POLYFLON», РАЗМЕРАМИ 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G», ПРОИЗВОДИТЕЛЯ POLY MEDICURE LTD, ИНДИЯ, ПУТЕМ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

АНАЛИЗ. КОНЪЮНКТУРА. ПЕРСПЕКТИВЫ

СЕРИКБАЕВА Э.А., ДАТХАЕВ У.М., УМУРЗАХОВА Г.Ж., ЖАКИПБЕКОВ К.С. Основные аспекты формирования фармацевтического кластера в Республике Казахстан.....7

Формирование и развитие национальных кластеров способствует эффективной интеграции интеллектуальных и финансовых ресурсов как внутри, так и за пределами такого объединения. Таким образом, в рамках кластерной модели группируется не только производственный, но и инновационный бизнес нового поколения. [10]

ТЛЕУБАЕВА М.И., АБДУЛЛАБЕКОВА Р.М., ДАТХАЕВ У.М. Бақша қараот (*Portulaca oleracea L.*) дәрілер технологиясында болашағы зор өсімдік ретінде.....11

Тарихи деректерге қарағанда бақша қараот өсімдігі халық медицинасында өте ерте заманнан белгілі. Ежелгі Египетте, Римде, Грекияда тағам ретінде қолданылған. Өз

заманында Гиппократ, Плиний бұл өсімдіктің шырынын, қайнатпасын, сұлы сығындыларын әртүрлі ауруларды емдеуде қолданған.

АЛЬМАДИЕВА А.К., ГАРКАЛОВ К.А., АБСАТТАРОВА К.С. Клинико-экономическая эффективность вилантерол/флутиказон фуората в двух дозах при неконтролируемой астме и хронической обструктивной болезни легких.....15

Вилантерол и флутиказона фуорат относятся к двум различным классам лекарственных препаратов: синтетический ГКС и селективный бета 2-адреномиметик длительного действия. Флутиказона фуорат – синтетический трехфтористый ГКС с выраженным противовоспалительным действием. Точный механизм действия, позволяющий купировать симптомы бронхиальной астмы и ХОБЛ, неизвестен. ГКС продемонстрировали широкий спектр действия на различные типы клеток, участвующих в процессе воспаления.

AYAZBEKOV A.K., NURKHASIMOVA R.G., IBRAEVA D.E., KHUDAIBERGENOVA S.S., BANTIYAROVA A.SH. Evaluation of the effectiveness of pregravid preparation of women of fertile age in the Turkestan region.....20

The frequency of complications of pregnancy, childbirth, the growth of gynecological morbidity, the low level of reproductive health of women at the present stage impose special requirements on the system of organization of obstetric and gynecological care. [2]

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

КУЗДЕНБАЕВА Роза С. Этиопатогенетические аспекты диагностики и лечения железодефицитной анемии и тромбоцитопенической пурпury, ассоциированных *Helicobacter pylori*.....23

Открытие *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) и доказательство ее ведущей патогенетической роли в развитии большинства патологических процессов в гастродуоденальной области кардинальным образом изменили подходы к диагностике и лечению данной группы заболеваний.

ТЕХНОЛОГИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЩИКОВСКИЙ А.Э., КРУТСКИХ Т.В., ДАТХАЕВ У.М. Изучение влияния вспомогательных веществ и параметров технологического процесса на критические показатели качества таблеток лекарственного препарата «Боризол».....25

Проведение расширенной научно-исследовательской работы в процессе фармацевтической разработки лекарственного препарата и масштабирования технологического процесса рекомендуется европейскими требованиями ICH Q8, Q9 и Q10 для обеспечения фармацевтическими предприятиями выпуска высокоэффективных лекарственных препаратов на протяжении всего их жизненного цикла. [3]

ПОИСК. ИССЛЕДОВАНИЯ. ЭКСПЕРИМЕНТ

АКАНОВА А.А., КАРИБАЕВА Д.О., АКАНОВА К.К. Анатомия и физиология NMDA-рецепторов.....32

NMDA-рецепторы регулируют возбудимость нервной ткани, оказывая влияние на формирование новых связей между нейронами (синаптическая пластичность). Сбой

в работе NMDA-рецепторов приводят к множеству тяжелых неврологических и психических нарушений, таких как эпилепсия, аутизм, шизофрения.

СУЛЕЙМАНОВ Т.А., ПАШАЕВА Н.Г. Изучение фенольных соединений травы *Veronica crista-galli stev.* из флоры Азербайджана методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.....37

В народной медицине широко применяется именно трава вероники, которая имеет выраженные лечебные свойства. В ней присутствуют витамины А и С, биофлавоноиды, жирные и эфирные масла, кумарины, холин, сапонины, стерины, иридоиды, алкалоиды, углеводы, дубильные вещества, горечи, фенолкарбоновые и органические кислоты.

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА И ФАРМАКОЛОГИЯ

АЛЬМУХАМБЕТОВА Р.К., ТЫНАЛИЕВА Ш.А., КАРАЖАНОВА Н.Б. К вопросу антигипертензивной терапии у женщин в постменопаузе.....40

Смертность от ишемической болезни сердца, нарушения мозгового кровообращения возрастают с каждым десятилетием в 3-5 раз. Поэтому наличие АГ у женщин в постменопаузе является основанием для назначения антигипертензивных препаратов.

ОСТРЕЦОВА Т.П., ЖУСУПОВА Г.К., АНСАТБАЕВА Т.Н., РАМАЗАНОВА А.Е. Эффективное обезболивание в паллиативной помощи.....43

По оценке ВОЗ, ежегодно из 10 млн новых случаев заболевания раком более половины приходится на развивающиеся страны. Ко времени постановки диагноза большинство заболевших оказывается неизлечимыми. Ежедневно в мире около 4 млн пациентов страдают от болей умеренной (10-15%), средней (30-40%) и сильной (60-80%) интенсивности. [5]

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ДЕМЕСИНОВА И.В., АЛПЫСПАЕВА Э.Г. Критерии отнесения продукции к медицинским изделиям в рамках Евразийского экономического союза.....48

Настоящий документ разработан в соответствии со статьей 31 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктом 2 статьи 3 Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года.