СОДЕРЖАНИЕ 12_17

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ……4

1. ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК ОБ ОТЗЫВЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «РЕФОРТАН®N, РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ 6%, 500 МЛ, ПРОИЗВОДСТВА БЕРЛИН-ХЕМИ АГ (МЕНАРИНИ ГРУП), ГЕРМАНИЯ (ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ – БЕРЛИН-ХЕМИ АГ (МЕНАРИНИ ГРУП) №303 ОТ 14.11.2017 г.

2. ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФАРМАЦИИ МЗ РК ОБ ОТЗЫВЕ НЕКОТОРЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» СОГЛАСНО ПЕРЕЧНЮ, УКАЗАННОМУ В ПРИЛОЖЕНИИ К НАСТОЯЩЕМУ ПРИКАЗУ, №307 ОТ 17.11.2017 Г.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦИИ

A.R. SHOPABAEVA, T.S. NURGOZHIN, STAVROS POULOPOULUS, S.K.MUKHANOVA. Electronic cigarettes: worldwide use and safety assessment.....**7**

An electronic cigarette (e-cigarette) is a device that allows you to inhale nicotine without most of the harmful effects of smoking. E-cigarettes work by heating and creating a vapour from a solution that typically contains nicotine, a thick, colourless liquid called propylene glycol and/or glycerine, and flavourings. [1,2]

А.Т. КАБДЕНОВА, Ж.А. САТЫБАЛДИЕВА. Компьютерное моделирование как современное направление создания иммунотропных лекарственных средств.....**10**

Фундаментальные достижения в области иммунологии и понимание о ведущей роли иммунных реакций в патогенезе многих заболеваний способствовали тому, чтобы терапия с помощью иммунотропных лекарственных препаратов вошла в повседневную медицинскую практику при самых разных патологиях.

ПОИСК. ИССЛЕДОВАНИЯ. ЭКСПЕРИМЕНТ

A.A. AKANOVA, A.K. YESHMANOVA, K.K. AKANOVA. The architecture of NMDA receptors……..**15**

NMDAR are important in development, LTP and LTD which may underlie molecular mechanisms of memory, pain perception and motor control; NMDAR pathological activation is strongly associated with several socially significant neurodegenerative and psychiatric diseases [24].

A.D. SADYKOVA, G.S. BAIMAKHANOVA. Polymorbid states in clinical practice (literature review)……**19**

For the last decades, changes in the description of health, incidence and mortality are observed. Such processes as aging, changing of the lifestyle, a social status, etc. are risk factors of chronic noncommunicable diseases development of [1,2].

М.Б. КОЙБАКОВ, К.С. БАБАЕВА, Б.М. БАЙДУЛЛАЕВ. Гемодинамическое обеспечение изометрических нагрузок больных, перенесших инфаркт миокарда, в процессе реабилитации.....23

По данным ВОЗ, в результате ишемической болезни сердца ежегодно умирает 2,5 млн человек. При правильной реабилитации около 80% больных могут стать трудоспособными. Благодаря мерам вторичной профилактики улучшается течение постинфарктного периода.

С.И. ИБРАГИМОВА, Ж.Н. ШАЛХАРОВА, К.С. БАБАЕВА. ЭКГ отклонения у лиц с избыточной массой тела ожирением и абдоминальным ожирением в популяционном исследовании.....27

Установлено, что электрокардиографические (ЭКГ) отклонения являются значимым прогностическим маркером ССЗ независимо от традиционных факторов риска. [11]

АНАЛИЗ. КОНЪЮНКТУРА. ПЕРСПЕКТИВЫ

С.Ш. ИСЕНОВА, Г.Ж. БОДЫКОВ, Б.К. КАБЫЛ, Н.У. ТИЛЕШЕВА, Ж.Н. КЫПШАКБАЕВА, Ж.Б. АМИРАЛИЕВА, А.Р. ТУРАР, Ш.М. САЙЛИБАЕВА, А. САРСЕБАЕВА, А.М. ЗКРИНА, Ж. НАРИМАНОВА. Причины увеличения количества операций кесарева сечения.....30

Одной из актуальных проблем современного акушерства является увеличение количества операций кесарева сечения, связанных с расширением показаний к оперативным родам, увеличением количества беременных с рубцом на матке, проведением операции по желанию женщины.

Ж.Б. КУЛАХМЕТОВА, А.А. СМАИЛОВА. Изучение корреляционной связи между клинико-биохимическими показателями и типами пищевого поведения.....35

Метаболический синдром (МС) сегодня – главная тема многих научных и клинических исследований. Одним из важных факторов, способствующих развитию МС, является избыточное потребление пищи, содержащей жиры, то есть неадекватное пищевое поведение, и низкая физическая активность [4-8].

А.А. АХМЕТЧЕ, Г.А. МУХАМБЕТОВА, З.Б. САКИПОВА. Сравнительный анализ номенклатуры миорелаксантов, зарегистрированных в Государственном реестре РК.....38

Многие острые и хронические заболевания опорно-двигательной системы сопровождаются появлением стойких спазмов скелетной мускулатуры, что усиливает имеющийся болевой синдром, зачастую способствуя закреплению патологических положений пораженных участков тела. Поэтому в схему лечения вводятся миорелаксанты.

Д.Н. АЙДАРБЕКОВА, Ж.Н. ШАЛХАРОВА. Изучение клинико-метаболических показателей в зависимости от уровней комплаентности у больных с метаболическим синдромом.....41

Комплексное клинико-психологическое обследование пациентов с различными клиническими вариантами течения метаболического синдрома дает возможность подбора адекватной медикаментозной терапии с учетом их индивидуально-личностных особенностей, что повышает комплаентность и эффективность лечения.

Г.Г. ШАРАБИТДИНОВА, С.С. АСКАРОВА, Ж.Н. ШАЛХАРОВА. Двенадцатилетняя динамика метаболических факторов риска у жителей Туркестанского региона в зависимости от сочетания полиморфизмов генов β1 и β3 адренорецепторов.....45

Важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и сахарного диабета (СД) 2 типа играет генетическая предрасположенность [1]. Во многих зарубежных исследованиях изучены гены ответственные за развитие ССЗ и СД 2 типа [2-4]. Исследования в этом направлении были проведены и в Казахстане [5-8].