

Содержание 6_2017

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ.....4

1. Приказ комитета фармации МЗ РК №109 от 10 мая 2017 года об отзыве некоторых регистрационных удостоверений лекарственных средств согласно перечню, указанному в приложении к настоящему приказу.
2. Приказ комитета фармации МЗ РК №132 от 26 мая 2017 года об отзыве некоторых регистрационных удостоверений лекарственных средств согласно перечню, указанному в приложении к данному приказу.
3. Приказ министра здравоохранения РК «О признании глобальной номенклатуры медицинских изделий в Республике Казахстан» №322 от 22.05.2017 года.

ТЕХНОЛОГИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

А.В. СТАДНИЧЕНКО, Ю.М. КРАСНОПОЛЬСКИЙ, Т.Г. ЯРНЫХ Оптимизация параметров дзета-потенциала при создании липосом с иринотеканом.....7

Сейчас известно более десятка типов наночастиц медицинского назначения. Их все возрастающее применение, как средств доставки лекарственных субстанций, определяется общими для всех наночастиц свойствами. Размер наночастиц во многом определяет их распределение в организме. Принятый термин, отражающий это свойство, есть пассивное нацеливание, своеобразный ситовой эффект.

O.V. SERMUKHAMEDOVA. Pharmaceutical development of "Sedocaps" capsules.....11

Scientists of S.D. Asfendiyarov's Kazakh National Medical University (Almaty, Kazakhstan) together with the National Pharmaceutical University (Kharkov, Ukraine) have developed capsules with the conditional name "Sedocaps", which have a pronounced sedative effect. Sedocaps is a combined herbal preparation whose pharmacological effect is due to the synergistic properties of phytosubstances – extracts from Turkestan motherwort, ziziphora Bunge, Turkestan valerian.

ПОИСК. ИССЛЕДОВАНИЯ. ЭКСПЕРИМЕНТ

L.K. БАКТЫБАЕВА, F.O. NURAHMET, V.K. YU. Study of the effect of piperidine compounds of the myelopoiesis of the bone marrow.....16

The purpose of the present research was studying action of new chemical substance BIV-7 on processes of restoration of blood production in bone marrow on a background of an intoxication of an organism by acetate of lead.

Д.М. КАДЫРОВА, Г.С. СМАГУЛОВА, И.И. КИМ, Э.М. САТБАЕВА, Л.В. АНАНЬЕВА. Местнообезболивающая активность новых производных пиперидина при проводниковой анестезии.....20

Ушли в прошлое времена, когда врачи проводили многие манипуляции без анестезии. Болевой порог различен у всех людей, и то, что один терпит без проблем, у другого вызывает невыносимую боль. Сегодня анестезия в медицинской практике располагает целым арсеналом средств для обезболивания.

D. SERDALIYEVA, B. MYRZABEK, E. SATBAYEVA, A. SEITALIYEVA, L. ANANIYEVA. Pharmacoepidemiological analysis of the use of drugs in the treatment of age-associated diseases.....22

According to epidemiological data, arterial hypertension (AH) is one of the most common diseases of the cardiovascular system in Kazakhstan and abroad. It is proposed that at 2030 COPD will occupy 3-e a place among leading causes of death in the world [6].

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРАВО

В.А. ШАПОВАЛОВА, В.В. ШАПОВАЛОВ, Н.А. ХМЕЛЕВСКОЙ. Организационно-правовые мероприятия по повышению доступности лекарственных средств в сельской

местности в условиях реформирования здравоохранения (судебно-фармацевтические аспекты).....**25**
В настоящее время в Украине есть ряд проблемных вопросов, касающихся недостаточной доступности медицинских услуг для сельских жителей, в том числе и по ассортименту лекарственных средств.
ШАПОВАЛОВА В.А., ШАПОВАЛОВ В.В., ШАПОВАЛОВ В.В., ЗБРОЖЕК С.И., РАДИОНОВА В.А. Доказательная фармация: особенности режима контроля лекарственных средств с психоактивными свойствами.....**30**
Употребление рецептурных лекарственных средств, синтетических стимуляторов и новых ПАВ вместо более традиционных наркотиков или в сочетании с ними стирает различия между потребителями конкретных наркотиков, вызывая в последние годы взаимосвязанные или циклично повторяющиеся всплески наркопотребления и связанные с ним последствия для здоровья [2].

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

КОЖАБЕКОВА Т.А, АМИРЕЕВА Г.Ж, КОЖАХМЕТОВА А.Ж, МИРЗАХМЕТОВА Н.Х. Изучение причин неразвивающейся беременности (ретроспективный и проспективный анализ).....**36**
При неразвивающейся беременности (missed abortion) происходит гибель эмбриона (плода) без появления признаков угрожающего выкидыша. Чаще этот тип прерывания беременности наблюдается при привычном невынашивании, гиперандрогении, аутоиммунных нарушениях и прочем. Диагноз подтверждается при ультразвуковом исследовании.
Б.Н. БИЩЕКОВА, Б.К. КАБЫЛ, Ш.А. КУДАЖАНОВА, М. ТОКТАСЫНКЫЗЫ, В. МАРАСУЛОВА, З. ГАДЖИЕВА, А. КОЖАНОВА, Е. КАМИДОЛЛА. Особенности течения туберкулеза легких во время беременности.....**40**
Согласно пункта 1.2 приказа МЗ РК № 404 от 17.06.2011 года «О мерах совершенствования мероприятий по борьбе с туберкулезом в Республике Казахстан», необходимо «обеспечить обязательное обследование всех родильниц на туберкулез методом флюорографии и (или) бактериоскопии в организациях первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) или территориальных противотуберкулезных организациях (передвижные флюороустановки) в течение периода нахождения в организации родовспоможения до момента выписки.
А.К.ИБРАЕВА, М.Б. ОСПАНОВА Клиническое наблюдение пациента с воспалительным заболеванием кишечника в ходе лечения биосимиляром инфликсимаба фламмегисом (flammegis).....**44**
Доказательством аутоиммунного характера воспалительных заболеваний кишечника является наличие системности поражения и сочетание с другими аутоиммунными заболеваниями, такими как гемолитическая анемия, интерстициальный фиброз легочной ткани, коллагенозы, тиреоидит.

ФАРМАКОГНОЗИЯ

Г.Т. ЖУМАШОВА, Г.М. САЯКОВА, Н.Г. ГЕМЕДЖИЕВА. Правила сбора, заготовки и хранения лекарственного растительного сырья Ревеня татарского (*Rheum tataricum* L.).....**46**
В статье представлены правила сбора, заготовки и хранения лекарственного растительного сырья ревеня татарского (*Rheum tataricum* L.). Исследование динамики накопления основных групп биологически активных веществ (антраценпроизводных) в разные вегетативные фазы позволило установить оптимальный период сбора сырья в фазу плодоношения ($1,71 \pm 0,04\%$).

